



## ИНСТРУКЦИЯ по применению Альбамелина для дегельминтизации животных

(организация-разработчик: ОАО завод «Ветеринарные препараты»,  
г. Гусь-Хрустальный)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование: Альбамелин® (Albamelinum).  
Международное непатентованное наименование действующего вещества: альбендазол.
2. Лекарственная форма: порошок для перорального применения.  
Альбамелин содержит в качестве действующего вещества альбендазол - 10%, а в качестве вспомогательного вещества цеолит (или мел) – до 100%.  
По внешнему виду препарат представляет собой мелкозернистый порошок светло-серого цвета, иногда с коричневым оттенком и вкраплениями.
3. Альбамелин выпускают расфасованным в полимерные банки, двойные герметично запаенные полиэтиленовые пакеты и в пакеты из ламинированной бумаги.
4. Альбамелин хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 30 °С.  
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.
5. Альбамелин следует хранить в недоступном для детей месте.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

### II. Фармакологические свойства

7. Альбамелин относится к антигельминтным препаратам широкого спектра действия.

Альбендазол, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром антигельминтного действия, эффективен при моно- и полиинвазиях, активен в отношении имаго и личинок нематод, трематод, а также имаго цестод; обладая овоцидным действием, снижает зараженность пастбищ яйцами гельминтов.

Механизм действия Альбамелина заключается в нарушении процессов транспорта глюкозы, микротубулярной функции и снижении активности фумарат редуктазы гельминтов, нарушении проницаемости клеточных мембран и мышечной иннервации, что вызывает у них паралич и приводит к гибели.

При пероральном введении препарата альбендазол всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в органы и ткани; максимальная концентрация в сыворотке крови отмечается через 18-25 часов после применения. Выводится альбендазол из организма животного с мочой и желчью в неизменном виде и в виде метаболитов, у лактирующих животных – частично с молоком, а у яйценосной птицы – с яйцами.

Альбамелин по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007): ЛД-50 при пероральном введении белым мышам превышает 3000 мг/кг массы, в рекомендуемых дозах не обладает гепатотоксическим и сенсibilизирующим действием.

### III. Порядок применения

8. Альбамелин назначают крупному рогатому скоту, овцам, свиньям, собакам, кошкам, лошадям, пушным зверям и сельскохозяйственной птице для лечения и профилактики нематодозов, трематодозов и цестодозов.

9. Противопоказанием к применению Альбамелина является индивидуальная повышенная чувствительность животного к альбендазолу. Лекарственный препарат не следует применять больным инфекционными болезнями и истощенным животным, курам-несушкам, жвачным при острой форме фасциолеза, стельным коровам и жеребым кобылам в первую треть беременности, суягным овцам, супоросным свиноматкам и самкам пушных зверей, собак и кошек в первую половину беременности, а также кормящим сукам и кошкам, щенкам до 3-недельного возраста, котят до 3-месячного возраста.

10. Препарат применяют индивидуально или групповым способом в смеси с кормом: жвачным животным, свиньям и лошадям – однократно, птице, собакам, кошкам и пушным зверям – двукратно в следующих дозах:

- Крупному рогатому скоту индивидуально: при мониезиозе, легочных и желудочно-кишечных нематодозах - 75 мг/кг массы и при хроническом фасциолезе – 100 мг/кг массы животного.

- Овцам индивидуальным или групповым способом: при мониезиозе, легочных и кишечных нематодозах - 50 мг/кг массы, при хроническом фасциолезе - 75 мг/кг массы животного. При групповом способе применения навеску препарата, рассчитанную на группу не более 150 овец, тщательно смешивают с комбикормом (из расчета 50-100 г комбикорма на животное). Смесь раскладывают в кормушки, обеспечивая к ним свободный доступ животных.

- Свиньям при аскаридозе и эзофагостомозе с концентрированными кормами в утреннее кормление - 100 мг/кг массы животного. Препарат в дозе, рассчитанной не более чем на 50 животных, смешивают с половиной нормы корма и раскладывают по кормушкам, обеспечивая животным к ним свободный доступ.

- Лошадям при параскаридозе и стронгилятозе, а также при смешанной параскаридозно-стронгилоидозной инвазии индивидуально, с кормом - 70 мг/кг массы животного.

- Сельскохозяйственной птице при аскаридозе, гетеракидозе и смешанной аскаридозно-гетеракидозной инвазии групповым способом два дня подряд в утреннее кормление в смеси с комбикормом, в дозе 100 мг/кг массы птицы.

- Плотоядным при нематодозах (токсокарозе, токсакаридозе, унцинариозе, анкилостомозе, трихоцефалезе) и цестодозах (дипилидиозе, дифиллоботриозе, мезоцестодозе, эхинококкозе и других тениозах) двукратно (два дня подряд) в разовой дозе (150 мг /кг) массы животного: пушным зверям - индивидуально или групповым способом, собакам и кошкам - индивидуально в смеси с небольшим количеством корма в утреннее кормление.

В случае отказа от корма с антигельминтиком, кошкам и собакам Альбамелин вводят принудительно в виде водной суспензии. С этой целью рассчитанное на животное количество Альбамелина суспендируют в питьевой воде, интенсивно взбалтывают и сразу вводят животному внутрь с помощью шприца без иглы. Лечебные обработки животных проводят по показаниям, профилактические – ежеквартально в терапевтической дозе.

Перед массовой обработкой каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (10-15 голов), за которыми ведут наблюдение в течение 3 суток. При отсутствии осложнений препарат применяют всему поголовью.

11. При передозировке лекарственного препарата может наблюдаться анорексия, нарушение функции желудочно-кишечного тракта, угнетением, отказом от корма. В этом случае применение лекарственного препарата прекращают и назначают симптоматические лекарственные средства.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или при его отмене не выявлено.

13. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков дегельминтизации животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной дегельминтизации лекарственный препарат необходимо ввести как можно скорее в той же дозе, далее интервал между введениями препарата не изменяется.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Альбамелина в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к производным группы бензимидазола карбоната и возникновения аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и назначают симптоматические лекарственные средства.

15. Совместное применение лекарственного препарата с дексаметазоном и цимитидином приводит к увеличению концентрации альбендазола в крови животного.

16. Убой крупного рогатого скота, овец, свиней и лошадей на мясо разрешается не ранее, чем через 20 суток, птицы – не ранее, чем через 5 суток после дегельминтизации. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения установленных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей или для производства мясокостной муки.

Молоко дойных животных запрещается использовать в пищевых целях в течение 4 суток после дегельминтизации. Полученное ранее этого срока молоко может быть использовано после термической обработки в корм животным.

#### IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Альбамелином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. После работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Альбамелином. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты» 601508, Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская д. 2.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Альбамелина, утвержденная Россельхознадзором 16 октября 2008 года.

Инструкция разработана ОАО завод «Ветеринарные препараты» 601508, Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская д. 2.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-32.13-1819 № ПВР-3-03/01254