

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н.А.ВЛАСОВ

16 АПР 2014

ИНСТРУКЦИЯ по применению Димципа для лечения и профилактики гиподерматоза крупного рогатого скота

(организация-разработчик: ОАО завод «Ветеринарные препараты»,
Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Димцип (Dimcipum)

Международное непатентованное наименование: циперметрин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Димцип содержит в качестве действующего вещества циперметрин - 2,5%, а в качестве вспомогательных веществ: диметилсульфоксид - 20%, полиэтиленгликоль-400 - 35%, спирт изопропиловый до 100%.

Димцип по внешнему виду представляет собой однородную прозрачную жидкость светло-желтого цвета.

3. Димцип выпускают расфасованным в стеклянных или полимерных флаконах, бутылках и полиэтиленовых канистрах.

4. Димцип хранят в закрытой упаковке организации-производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от минус 25⁰С до 40⁰С.

Срок годности Димципа при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания срока годности.

5. Димцип следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Димцип относится к группе инсектицидных средств.

Циперметрин, входящий в состав Димципа, относится к группе синтетических пиретроидов. Активен в отношении имаго и личинок 2 и 3 стадии развития оводов *Hypoderma bovis*. Механизм действия циперметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель паразитов.

Димцип по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим, резорбтивно-токсическим и сенсibilизирующим действием.

III. Порядок применения

8. Димцип применяют для лечения и профилактики гиподерматоза крупного рогатого скота.

9. Противопоказанием к применению препарата служит индивидуальная чувствительность животных к компонентам препарата. Димцип не следует применять больным, ослабленным, истощенным животным, стельным коровам в последнюю треть беременности.

10. С целью профилактики животных обрабатывают в период лёта оводов (июнь-август), двух-трехкратно, но не чаще чем 1 раз в 15 дней.

С лечебной целью обрабатывают только пораженных личинками овода животных весной (март-апрель) однократно.

Димцип наносят на волосяной покров животного тонкой струйкой с обеих сторон позвоночного столба с помощью дозирующих устройств (шприца-полуавтомата Шилова, шприца Жанэ, автомата-дозатора АД-1) в дозе 20 мл на взрослое животное и 15 мл на молодняк.

Перед массовыми обработками каждую серию Димципа проверяют на небольшой группе животных (10 – 15 голов) разного возраста и упитанности. При отсутствии признаков отравления в течение 48 часов приступают к обработке всего поголовья.

11. Симптомов передозировки Димципом не установлено.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или при его отмене не выявлено.

13. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки лекарственным препаратом применение его следует продолжить как можно скорее, далее интервал между обработками не изменяется.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Димципа в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (зуд, покраснение, сыпь) применение Димципа прекращают и, при необходимости, назначают животному антигистаминные препараты.

15. Не следует одновременно применять инсектицидные препараты других групп.

16. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 24 часа после последней обработки. В случае вынужденного убоя ранее установленного срока мясо используют на корм плотоядным животным. Молоко дойных коров может быть использовано в пищу не ранее, чем через 12 часов после обработки. Молоко, полученное ранее этого срока, используют на корм животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Димципом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Каждый работающий с Димципом должен быть обеспечен и обязан пользоваться комплектом спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, фартук прорезиненный, сапоги резиновые, очки защитные, респиратор марок Ф-62 (ШМ), «Астра-2», типа «Лепесток-40, «Лепесток-5»).

Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы спецодежду необходимо снять, лицо и руки вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Димципом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под Димципа запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты» 601508, Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская д. 2.

Инструкция разработана ОАО завод «Ветеринарные препараты» (601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.).

С утверждением настоящей инструкции теряет силу инструкция по применению Димципа, утвержденная Россельхознадзором 01 декабря 2008 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения 12-3-1.14-1918 № ПБР-3-7.8/02272