



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя

Россельхознадзора

Е.А. Непоклонов

11 СЕН 2013

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Гликосана для лечения и профилактики респираторных
болезней животных

(организация-разработчик: ОАО завод «Ветеринарные препараты»,
Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Гликосан (Glicosanum).

Международное непатентованное наименование: натр едкий.

2. Лекарственная форма: раствор для аэрозольного применения.

Гликосан содержит в качестве действующего вещества натр едкий - 3 %, а в качестве вспомогательного вещества триэтиленгликоль - до 100%.

Гликосан по внешнему виду представляет собой однородную жидкость маслянистой консистенции, от светло-желтого до коричневого цвета.

3. Гликосан выпускают расфасованным в стеклянных флаконах, бутылках или в полиэтиленовых канистрах, флаконах.

4. Гликосан хранят в закрытой упаковке организации-производителя в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от минус 20 °С до 50 °С.

Срок годности Гликосана при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства. Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания срока годности.

5. Гликосан следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Гликосан относится к группе антисептиков.

Натр едкий, входящий в состав Гликосана, нарушает жизненно важную деятельность микробов – размножение и деление. Гликосан в форме аэрозоля действуют бактерицидно на вегетативные формы микробов: кишечную палочку, протей; вирулицидно: на вирусы ящура, чумы свиней, инфекционной анемии лошадей. При ингаляции санирует дыхательные пути животных, в т. ч. птиц. Обладает противовоспалительными, фунгицидными и спороцидными свойствами.

По степени воздействия на организм Гликосан относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

8. Гликосан применяют аэрозольно в комплексе лечебно-профилактических мероприятий при борьбе с респираторными болезнями молодняка крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы, в том числе при бронхите и бронхопневмонии телят, при инфекционном бронхите, инфекционном ларинготрахеите и колибактериозе птиц.

9. Противопоказанием к применению Гликосана служит повышенная индивидуальная чувствительность животных к компонентам препарата. Лекарственный препарат не применяют в хозяйствах, где проводятся аэрозольные вакцинации, за один день перед каждой вакцинацией, в день проведения вакцинации и спустя два дня после него.

10. Для аэрозольной обработки используют 30 % раствор Гликосана с нормой распыления 1,5-1,8 мл/м³. Указанный раствор готовят в стеклянной, пластмассовой, эмалированной или оцинкованной посуде в расчете на объем обрабатываемого помещения.

Например, на объем помещения 1000 м³, при распыляемой дозе 1,5 мл/м³ требуется раствор Гликосана 1000м³ х 1,5 мл = 1500 мл. Для приготовления раствора берут 450 мл Гликосана и добавляют, при перемешивании, 1050 мл чистой водопроводной воды. Температура воды и Гликосана должна быть в пределах 16 - 30 °С.

Приготовленный раствор Гликосана разливают в аэрозольные аппараты /АРЖ, САГ-1, САГ-10 и др./, обеспечивающие величину аэрозольных частиц 0,5 - 20 мкм. Давление сжатого воздуха на входе в аэрозольный генератор должно быть 4-4,5 кгс/см². Заполненные раствором аппараты герметично закрывают и устанавливают в обрабатываемом помещении согласно инструкции по эксплуатации аппарата.

Перед началом распыления Гликосана помещение герметизируют: плотно закрывают двери, окна, вентиляционные люки, выключают приточно-вытяжную вентиляцию.

При угрозе возникновения заболевания проводят 8-10 обработок аэрозолем Гликосана с интервалом между каждой обработкой 3 суток.

В случае возникновения заболевания, обработки аэрозолем Гликосана проводят курсами - по 2-3 дня подряд, один раз в день, с интервалом 3 дня между каждым курсом. Всего проводят 4-5 таких курсов.

Длительность распыления Гликосана не должна превышать 10 минут, экспозиция после распыления 30 минут.

По окончании экспозиции помещение проветривают - открывают окна, двери, вентиляционные люки и включают вентиляцию.

11. Симптомов передозировки Гликосаном не установлено.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или при его отмене не установлено.

13. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки лекарственным препаратом применение его следует продолжить как можно скорее, далее интервал между обработками не изменяется.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Гликосана в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций (зуд, покраснение,

сыпь) применение Гликосана прекращают и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты.

15. Несовместимость с другими лекарственными средствами и противопоказаний для применения не установлено. Обработка помещений аэрозолями Гликосана не исключает использование средств специфической терапии, а также проведение лечебно-профилактических мероприятий при инфекционных болезнях животных и птиц, предусмотренных соответствующими инструкциями.

16. Продукты животноводства и птицеводства во время и после применения Гликосана используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Гликосаном следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Гликосаном. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под Гликосана запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты» 601508, Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская д. 2.

Инструкция разработана ОАО завод «Ветеринарные препараты» (601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.).

С утверждением настоящей инструкции теряет силу инструкция по применению Гликосана, утвержденная Россельхознадзором 12 мая 2008 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-21.13-1539/ПВР-3-1.8/02131