

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Роспотребнадзора



Е.А. Непоклонов

15 АВГ 2012

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Мази ихтиоловой 10% и 20%
для лечения заболеваний кожи у животных
(организация-производитель ОАО завод «Ветеринарные препараты», Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь ихтиоловая 10% и 20% (Unguentum Ichtyoli 10% и 20%) .
Международное непатентованное название: ихтиол.
2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.
Мазь ихтиоловая 10% и 20% содержит в 100 г в качестве действующего вещества соответственно 10 г или 20 г ихтиола, а в качестве вспомогательного вещества вазелин медицинский или вазелин ветеринарный соответственно – 90 г или 80 г. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой мазь темно-бурого цвета со специфическим запахом ихтиола.
3. Выпускают Лекарственный препарат расфасованным в стеклянные банки с навинчивающимися крышками или полимерные банки, укупоренные крышками с контролем первого вскрытия, или в тубы полимерные.
4. Мазь ихтиоловую 10% и 20% хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.
Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.
5. Мазь ихтиоловую 10% и 20% следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний кожи наружного применения.
Мазь ихтиоловая 10% и 20% относится к антисептическим и противовоспалительным лекарственным средствам.
Ихтиол, входящий в состав препарата, за счет содержащихся в нем ароматических соединений и органически связанной серы, оказывает противовоспалительное, антисептическое, слабое местноанестезирующее и кератопластическое действие.

При нанесении на кожу и слизистые вызывает слабое раздражение чувствительных нервных окончаний, сменяющееся понижением их чувствительности, что приводит к улучшению трофики тканей. Благоприятно влияет на область воспаления кожи и подкожных слоев, регулирует сосудистый тонус, восстанавливает кровообращение, способствует рассасыванию инфильтратов.

Мазь ихтиоловая 20% действует кератолитически, способствуя размягчению эпидермиса.

Мазь ихтиоловая 10% и 20% по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

8. Мазь ихтиоловую 10% и 20% применяют животным при заболеваниях кожи (ожоги, раны, экземы, дерматиты, фурункулезе, пиодермии), а также при невралгиях, миозитах, артритах, бурситах, тендинитах, тендовагинитах, болезнях копыт и копытец (раны подошвы копыта и мякиша, флегмона венчика, гнойный пододерматит и др.).

9. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к ихтиолу.

10. Мазь ихтиоловую 10% и 20% применяют наружно, нанося её тонким ровным слоем на пораженные участки кожи 1-2 раза в день в течение 5-10 суток (при необходимости используют повязку).

Для предотвращения слизывания лекарственного препарата мелким животным надевают шейный воротник.

При артритах, бурситах, миозитах мазь втирают наружно.

11. Симптомы передозировки лекарственного препарата не установлены.

12. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки лекарственным препаратом применение его следует продолжить как можно скорее, далее интервал между обработками не изменяется.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Мази ихтиоловой 10% и 20% в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата возможно развитие аллергических реакций местного или общего характера. При появлении признаков раздражения кожи обработку прекращают, мазь снимают тампоном и смывают водой.

15. Применение Мази ихтиоловой 10% и 20% исключает использование других лекарственных препаратов наружного применения аналогичного назначения.

16. Продукцию животного происхождения, полученную от животных, обработанных Мазью ихтиоловой 10% и 20% в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Мазью ихтиоловой 10% и 20% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с участками кожи не подлежащими обработке или слизистыми оболочками глаза, препарат следует снять тампоном и промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Мазью ихтиоловой 10% и 20%. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые банки (тубы) из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты», 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.

Инструкция разработана ОАО завод «Ветеринарные препараты» (601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Мази ихтиоловой 10% и 20%, утвержденная Россельхознадзором 11 декабря 2006 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения 12-3-12.12-0913 № ПВР-3-1.9/00119