



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Е. А. Непоклонов

24 СЕН 2012

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению Мази камфорной 10% для лечения артритов, бурситов,  
тендовагинитов, миозитов у животных, субклинического мастита у коров  
в сухостойный период.

(Организация-разработчик: ОАО завод «Ветеринарные препараты»,  
Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный)

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь камфорная 10%  
(Unguentum Camphoratum 10%)

Международное непатентованное название: камфора.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь камфорная 10% содержит в 100 г качестве действующего вещества камфору - 10 г, а в качестве вспомогательных веществ – ланолин - 30 г, вазелин медицинский (или ветеринарный) – до 100 г. Мазь камфорная 10% представляет собой однородную мазь желтого цвета разных оттенков со специфическим запахом камфоры.

3. Мазь камфорную 10% выпускают расфасованной в стеклянных банках с навинчивающимися крышками или в полимерных банках с крышкой с контролем первого вскрытия, или в тубах полиэтиленовых.

4. Хранят Мазь камфорную 10 % в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5<sup>0</sup> С до 20<sup>0</sup> С.

Срок годности Мази камфорной 10% при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания срока годности.

5. Мазь камфорную 10% следует хранить в местах недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

**II. Фармакологические свойства**

7. Фармакотерапевтическая группа: противовоспалительные препараты для наружного применения.

Мазь камфорная 10% оказывает антисептическое, местнораздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие. Эти действия обусловлены наличием в молекуле камфоры функционально активной молекулы кислорода, которая имеет высокий окислительный потенциал. Лекарственный препарат, возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.

По степени воздействия на организм Мазь камфорная 10% согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к малоопасным веществам (4 класс опасности).

### III. Порядок применения

8. Мазь камфорную 10% применяют для лечения артритов, бурситов, тендовагинитов, миозитов у животных, а также субклинического мастита у коров в сухостойный период.

9. Противопоказанием к применению Мази камфорной 10% является повышенная индивидуальная чувствительность животных к компонентам препарата. Не следует применять лекарственный препарат лактирующим животным.

10. Перед применением Мази камфорной 10% с пораженных мест удаляют механические загрязнения, при необходимости выстригают шерсть.

Мазь применяют наружно в виде растираний, нанося её ровным тонким слоем при помощи шпателя, ватно-марлевого тампона или руками в стерильных резиновых перчатках на участок кожи в области воспалительного процесса и втирая легким массирующим движением в течение 2-3 минут 1-2 раза в сутки, в течение 10-12 дней. Мазь камфорную 10% не следует наносить на участки с нарушением целостности кожного покрова.

11. Симптомы передозировки препарата у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или при его отмене не установлено.

13. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки лекарственным препаратом применение его следует продолжить как можно скорее, далее интервал между обработками не изменяется.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Мази камфорной 10% в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата возможны индивидуальные реакции (раздражение кожи, головокружение, возбуждение), в случае которых обработку прекращают, мазь снимают тампоном и смывают водой.

15. Не применять одновременно с другими лекарственными средствами местного назначения.

16. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 24 часа после последнего применения Мази камфорной 10%. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

### IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Мазью камфорной 10% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью камфорной 10%. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые банки (тубы) из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты», 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.

Инструкция разработана ОАО завод «Ветеринарные препараты» (601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.).

С утверждением настоящей инструкции теряет силу инструкция по применению Мази камфорной 10% , утвержденная Россельхознадзором 2 мая 2007 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ »

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-18.12-1002 № ПЗР-3-1.9/00158