


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО завод «Ветеринарные
препараты»
М.Л Яхаев
15 февраля 2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Овасепта-К для дезинфекции объектов ветнадзора.

(организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты», Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование средства: Овасепт – К (Ovaseptum-K).
Международное непатентованное название: Катамин АБ
2. Овасепт - К представляет собой жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Овасепт-К содержит в качестве действующего вещества 35% катамина АБ (алкилдиметилбензиламмония хлорид), а в качестве вспомогательных веществ - изопропиловый или этиловый спирт, 1,2 - пропиленгликоль или полиэтиленоксид - 400.
3. Срок годности Овасепта-К при соблюдении условий хранения – 3 года со дня выпуска. Запрещается использовать средство после окончания срока годности.
4. Овасепт-К хранят в закрытой упаковке организации-производителя, в сухом помещении, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, недоступном для посторонних лиц и животных, при температуре от 0°C до 30°C.
5. Овасепт-К следует хранить в недоступном для детей месте.
6. Овасепт-К с истекшим сроком годности обезвреживают 3% раствором кальцинированной соды. Загрязненную средством тару обезвреживают заполнением на 5-6 часов 3-5% раствором кальцинированной соды, после чего промывают водой. Рабочие эмульсии, дренажные стоки и промывные воды, образующиеся при уборке и обезвреживании помещений, транспортных средств, тары, аппаратуры и спецодежды, собираются в бетонированный резервуар и обрабатываются хлорной известью (500 г на 10 л стоков).

II. Фармакологические свойства

7. Фармакотерапевтическая группа: препараты для дезинфекции.
Овасепт-К – средство из группы катионных поверхностно-активных веществ.
Катамин АБ, входящий в состав Овасепта-К, обладает широким спектром противомикробного и противовирусного действия (исключая микобактерии и спорообразующие микроорганизмы), действует на штаммы бактерий, устойчивые к антибиотикам и другим химиотерапевтическим препаратам.
По степени воздействия на организм Овасепт-К относится к умеренно опасным соединениям (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых концентрациях Овасепт-К не обладает кожно-резорбтивным, местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

8. Овасепт-К применяют в качестве дезинфицирующего средства для проведения:

- профилактической обработки животноводческих и птицеводческих помещений, убойных цехов, птицеперерабатывающих хозяйств, инкубаториев, оборудования, средств ухода за животными, транспортных средств, яичной и мясной тары;
- вынужденной (текущей и заключительной) обработки объектов ветнадзора при инфекционных болезнях бактериальной и вирусной этиологии;
- обработки инкубационных яиц.

9. Противопоказанием к применению Овасепта-К служит повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

10. Перед проведением обработки проводят тщательную механическую очистку и мойку обрабатываемых объектов, так как органические загрязнения снижают saniрующую активность Овасепта-К.

Овасепт-К применяют в отсутствии животных и птицы методом орошения в виде 1,0 % водного раствора при норме расхода 0,3-0,5 л/м² обрабатываемой поверхности и экспозиции 3 часа (при расчете концентрации рабочих растворов Овасепт-К принимают за 100 % вещество).

По окончании экспозиции полы, стены и другие участки помещений и оборудования инкубаториев, убойных цехов, мясной и яичной тары, а также транспортных средств обмывают водой для удаления остатков Овасепта-К. Обмывание инкубационных и выводных шкафов не требуется. Наличие на их поверхностях остатков средства обеспечивает saniрующее действие в течение периода инкубации.

В помещениях для содержания животных и птицы по окончании экспозиции моют кормушки, поилки, оборудование и доступные для животных и птицы участки поверхностей, помещение тщательно проветривают и просушивают, после чего разрешается вход обслуживающего персонала и размещение животных и птицы.

Для обработки поверхности инкубационных яиц применяют 0,25% раствор Овасепта-К.

Чистые яйца нормальной формы, без боя, трещин и насечек, уложенные в лотки, перед закладкой на инкубацию, обрабатывают методом погружения в емкость с раствором Овасепта-К на 3-5 секунд, после чего подсушивают на воздухе при комнатной температуре в течение 30-60 мин. Дополнительной обработки яиц в процессе инкубации не требуется.

11. Овасепт-К не вызывает побочного действия и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией.

12. Овасепт-К не назначают одновременно с другими дезинфицирующими средствами из-за возможности их взаимной инактивации.

IV. Меры личной профилактики

13. При работе с Овасептом-К следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности.

14. Все виды работ с Овасептом - К проводят с использованием средств индивидуальной защиты (хлопчатобумажный костюм или халат, резиновые перчатки, фартук и нарукавники из прорезиненной ткани или полиэтиленовой пленки), для защиты органов дыхания и глаз используют марлевые повязки или респираторы типа Кама, РПГ-67, ШБ-1 «Лепесток» и защитные очки.

Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать.

Проведение обработки растворами Овасепта-К в присутствии людей в помещении без средств индивидуальной защиты органов дыхания не допускается.

15. При попадании Овасепта - К или его растворов на кожу, пораженные места следует тщательно вымыть водой с мылом, обработать кожу кремами на жировой основе,

при попадании на слизистые оболочки - промыть большим количеством проточной воды в течение 1 - 2 минут. При необходимости обратиться в лечебное учреждение.

При попадании растворов Овасепта - К в желудок необходимо дать пострадавшему выпить 3-4 стакана теплой воды с 8-10 таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

При появлении у работающих признаков отравления (головокружение, общая слабость, тошнота) необходимо прекратить работу, снять спецодежду, вымыть лицо, руки и обратиться к медицинскому работнику.

16. Рабочие растворы Овасепта – К не вызывают коррозии металлов, не разрушают пластмассы, резину и другие материалы.

17. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты» 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.

Инструкция разработана ОАО завод «Ветеринарные препараты» (г. Гусь-Хрустальный)