


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора


Е.А. НЕПОКЛОБОВ
23 МАР 2015

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стартин-фито для профилактики и ранней терапии острых желудочно-кишечных заболеваний неинфекционной этиологии у новорожденных телят

(организация-разработчик: ОАО завод «Ветеринарные препараты»,
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Стартин-фито (Startinum-fito).

Международное непатентованное наименование: декстроза, натрия хлорид, кальция лактат, аскорбиновая кислота, зверобоя продырявленного травы экстракт.

2. Лекарственная форма: порошок для перорального применения.

Стартин-фито в качестве действующих веществ в одной комплект-упаковке (555 г) содержит: глюкозу – 250 г, натрий хлористый – 50 г, аскорбиновую кислоту – 5 г, кальций молочнокислый – 10 г, сухой экстракт зверобоя – 20 г, а в качестве вспомогательного вещества – натрий карбоксиметилцеллюлозу (бланозе) – 220 г.

По внешнему виду содержимое пакетов представляет собой:

- пакета № 1 (натрий карбоксиметилцеллюлоза) – порошок от белого до коричневатого серого цвета;
- пакета № 2 (глюкоза) – белый кристаллический порошок;
- пакета № 3 (натрий хлористый, кальций молочнокислый, кислота аскорбиновая) – порошок белого цвета;
- пакета № 4 (сухой экстракт зверобоя) – порошок или гранулы от светло желтого до коричневого цвета.

3. Стартин-фито выпускают в комплект-упаковке, состоящей из четырех герметично запаянных полиэтиленовых пакетов, расфасованным по: 220 г (пакет № 1), 250 г (пакет № 2), 65 г (пакет № 3) и 20 г (пакет № 4). Каждая потребительская упаковка снабжается инструкцией по применению.

4. Стартин-фито хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°C до 30°C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания срока годности.

5. Стартин-фито следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Стартин-фито относится к комбинированным лекарственным препаратам, применяемым при желудочно-кишечных заболеваниях неинфекционной этиологии.

Входящие в состав Стартин-фито активные компоненты активизируют процессы пищеварения, предупреждают образование в сычуге казеиновых безоаров, оказывают гепатопротекторное действие, нормализуют водно-солевой баланс организма.

Биологически активные вещества зверобоя - горечи, флавоноиды, эфирные масла, дубильные вещества усиливают секрецию слюны, желчи и желудочного сока, улучшают аппетит, обладают антисептическим, общеукрепляющим, спазмолитическим, гепатопротекторным, противовоспалительным и вяжущим действием.

Глюкоза оказывает общеукрепляющее и антитоксическое действие, повышая способность печени к обезвреживанию токсинов, активизирует окислительно-восстановительные процессы в организме.

Натрий хлористый и кальций молочнокислый оказывают дезинтоксикационное и регидратирующее действие, восполняют дефицит натрия и кальция при обезвоживании, уменьшают проницаемость сосудов.

Аскорбиновая кислота участвует в окислительно-восстановительных реакциях, процессах кроветворения, регенерации тканей, нормализации проницаемости капилляров, оказывает выраженное антиоксидантное действие, улучшает антиоксическую функцию печени, стимулирует железы внутренней секреции, повышает сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам.

По степени воздействия на организм Стартин-фито относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах и концентрациях не оказывает раздражающего и sensibilizing действия.

III. Порядок применения

8. Стартин-фито применяют новорожденным телятам для профилактики и ранней терапии острых желудочно-кишечных заболеваний неинфекционной этиологии.

9. Противопоказанием к применению Стартин-фито является повышенная индивидуальная чувствительность животных к компонентам препарата.

10. Стартин-фито применяют телятам перорально индивидуально в форме раствора, для приготовления которого содержимое четырех пакетов помещают в чистую эмалированную посуду и растворяют в 10 л горячей воды (70-80 °C), тщательно растирая плавающие комочки, и оставляют на сутки при комнатной температуре, несколько раз перемешивая.

Приготовленный раствор пригоден для использования в течение 5 суток при условии хранения его в прохладном месте (при температуре не выше 15°C.). Перед применением раствор следует подогреть до 37-38°C.

С целью профилактики желудочно-кишечных заболеваний телятам в течение двух дней после рождения в каждую разовую порцию молозива первых 6 выпоек добавляют по 250 мл лечебного раствора Стартин-фито и выпаивают из сосковой поилки.

С лечебной целью теленку в очередные два кормления взамен молока выпаивают по 0,5-0,7 л теплой воды с добавлением 250 мл лечебного раствора Стартин-фито. В последующие кормления в каждую порцию выпаиваемого молока добавляют 250 мл раствора Стартин-фито и 1,25-1,5 л теплой питьевой воды. Лечение продолжают до клинического выздоровления животного.

Перед каждым применением лечебный раствор Стартин-фито следует тщательно перемешивать.

11. Симптомы передозировки препарата у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата Стартин-фито при его первом применении и при его отмене не установлено.

13. В случае пропуска одной дозы препарата её следует ввести как можно скорее, но если до очередного приёма осталось немного времени то, не удваивая дозу, следует провести выпаивание лекарственного препарата.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Стартина-фито в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают антигистаминные или другие симптоматические средства.

15. Применение Стартина-фито не исключает использование лекарственных препаратов других фармакологических групп.

16. Продукцию животного происхождения, полученную во время и после применения Стартина-фито, разрешается использовать на общих основаниях.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе со Стартином-фито следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со Стартином-фито. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под Стартина-фито запрещается использовать для бытовых целей, она подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты», 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, 2.

Инструкция разработана ОАО завод «Ветеринарные препараты» (601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, 2).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-2.15-2553 № ПЗР-3-2.15/03118