



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Е.А. Непоклонов

31 AUG 2012

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Терраветина-500 для лечения желудочно-кишечных
болезней бактериальной этиологии у телят, поросят и ягнят

(организация-разработчик: ОАО завод «Ветеринарные препараты»,
г. Гусь-Хрустальный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: Терраветин-500 (Terravetin-500)

Международное непатентованное наименование действующего
вещества: окситетрациклина гидрохлорид.

2. Лекарственная форма: порошок для перорального применения.

Терраветин-500 содержит в качестве действующего вещества 500
мкг/мг окситетрациклина гидрохлорида, а в качестве вспомогательного
вещества — глюкозу. По внешнему виду препарат представляет собой
порошок желтого цвета.

3. Терраветин-500 выпускают расфасованным в двойных герметично
запаянных полиэтиленовых пакетах.

4. Терраветин-500 хранят в закрытой упаковке производителя в сухом,
защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов
питания и кормов при температуре от 5 до 25 °С.

Срок годности Терраветина-500 при соблюдении условий хранения - 1
год с даты производства. Запрещается использовать Терраветин-500 после
окончания срока годности.

5. Терраветин следует хранить в местах недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в
соответствии с требованиями законодательством.

II. Фармакологические свойства

7. Терраветин-500 относится к антибактериальным препаратам группы
тетрациклинов.

Входящий в состав Терраветина-500 окситетрациклин обладает
широким спектром антимикробного действия в отношении большинства
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, спирохет,

лептоспир, риккетсий, крупных вирусов, некоторых простейших (трихомонады, амёбы и др.). Окситетрациклин не активен в отношении синегнойной палочки и протей.

Механизм действия окситетрациклина заключается в нарушении синтеза белка в микробной клетке.

При введении внутрь окситетрациклин частично всасывается из желудочно-кишечного тракта в кровь и проникает во многие ткани и органы. Окситетрациклин выводится из организма преимущественно в неизменном виде с желчью и мочой.

По степени воздействия на организм Терраветин-500 относится ко 2 классу опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76.

III. Порядок применения

8. Терраветин-500 применяют перорально с лечебной целью при пастереллезе, колибактериозе, сальмонеллезе, гастроэнтероколитах бактериальной этиологии у телят, поросят и ягнят.

9. Противопоказанием к применению Терраветина-500 служит повышенная индивидуальная чувствительность животных к антибиотикам тетрациклиновой группы, серьезные нарушения функций печени и почек.

10. Терраветин-500 больным животным вводят индивидуально или групповым методом с кормом или водой для поения в следующих дозах: телятам и ягням 20-40 мг, поросятам 30-60 мг на 1 кг массы животного с интервалом 10-12 часов в течение 5-7 дней.

11. Симптомы передозировки Терраветином-500 проявляются расстройством желудочно-кишечного тракта, угнетением, отказом от корма.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или при его отмене не установлено.

13. В случае пропуска очередной дозы Терраветина-500 ее следует ввести как можно скорее; не принимать, если почти наступило время приема следующей дозы; не удваивать дозы.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Терраветина-500 в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают антигистаминные или другие симптоматические средства.

15. Не следует применять Терраветин-500 совместно с бактерицидными антибиотиками других групп (пенициллины, цефалоспорины, фторхинолоны). Одновременно с препаратом не рекомендуется применять антациды, каолин, а также препараты, содержащие железо, магний, кальций и алюминий.

16. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Терраветином-500 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Терраветином-500. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под Терраветина-500 запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты» 601508, Владимирская область г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская д. 2.

С утверждением настоящей инструкции теряет силу инструкция по применению Терраветина-500, утвержденная Россельхознадзором 18 апреля 2007 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-18.12-0954 № ПЗР-3-2.1/00840