



ИНСТРУКЦИЯ по применению Йодинокolia для лечения и профилактики респираторных заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

(организация-разработчик: ОАО завод «Ветеринарные препараты»,
Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Йодинокolia (Iodinokolum)

Международное непатентованное название: йод

2. Лекарственная форма: раствор для аэрозольного применения

Йодинокolia содержит в качестве действующего вещества йод - 1,4%, а в качестве вспомогательных веществ: калий йодистый - 0,5 %, поливиниловый спирт - 1,0 %, триэтиленгликоль - 10 %, молочную кислоту - 15 % и воду - до 100%. По внешнему виду представляет собой маслянистую однородную жидкость от сине-зеленоватого до темно-синего цвета, с запахом молочной кислоты и йода, смешивающуюся с водой в любых соотношениях и легко распыляющуюся аэрозольными аппаратами, образуя устойчивый синий туман.

Йодинокolia выпускают расфасованным в стеклянных бутылках, флаконах или в полиэтиленовых флаконах, флягах, канистрах.

3. Срок годности Йодинокolia при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления. Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания срока годности.

4. Йодинокolia хранят в плотно закрытой упаковке организации-производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от минус 10⁰С до 30⁰С.

5. Йодинокolia следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения и профилактики респираторных заболеваний.

Йодинокolia обладает бактерицидным, вирулицидным, фунгицидным действием. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе возбудителей колибактериоза, ларинготрахеита, ринотрахеита, бронхита, бронхопневмонии, аспергиллеза. При применении в форме аэрозоля Йодинокolia saniрует воздух и оказывает местное saniрующее действие на органы дыхания животных, в том числе птиц.

Йодинокolia по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Йодинокolia в форме аэрозоля применяют в присутствии животных и птиц в птицеводческих хозяйствах, на комплексах (фермах) по выращиванию крупного рогатого скота и других видов животных с профилактической и лечебно-профилактической целями при респираторных заболеваниях: инфекционном ларинготрахеите, инфекционном

бронхите, колибактериозе, аспергиллезе птиц; инфекционном ринотрахеите, бронхите и бронхопневмонии телят, бронхопневмонии сельскохозяйственных животных.

9. Противопоказанием к применению Йодинокolia служит повышенная индивидуальная чувствительность животных к йоду и другим компонентам препарата.

10. Рабочий раствор Йодинокolia готовят непосредственно перед применением под руководством ветеринарного врача или ветеринарного фельдшера и используют только в день его приготовления.

Для приготовления рабочего раствора в стеклянную, пластмассовую или эмалированную посуду наливают Йодинокolia и добавляют к нему равное по объему количество водопроводной воды. Воду добавляют постепенно при постоянном помешивании раствора. Температура воды и рабочего раствора Йодинокolia должна быть в пределах 25-30°C.

Перед обработкой помещения герметизируют (плотно закрывают окна, двери, вентиляционные люки, выключают приточно-вытяжную вентиляцию), убирают остатки корма и воды, осуществляют сбор яиц. Обслуживающий персонал в помещения в период обработки не допускается.

Для распыления рабочего раствора Йодинокolia, используют аэрозольные аппараты, обеспечивающие получение аэрозольных частиц величиной 0,5-20 мкм, типа АРЖ, САГ-1, САГ-10, в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

Норма расхода рабочего раствора Йодинокolia при экспозиции 30 минут составляет 1,0-1,5 мл/м³.

Профилактические обработки животных, в т.ч. птиц, проводят, начиная с первых дней жизни или за 6-10 дней до предполагаемого появления признаков заболевания, лечебно-профилактические - при возникновении заболевания.

С профилактической целью проводят 8-10 аэрозольных обработок с интервалом 2-3 дня.

С лечебно-профилактической целью проводят 12 аэрозольных обработок в четыре цикла по 2-3 дня подряд каждый цикл, с интервалом между циклами 2-3 дня.

После окончания аэрозольной обработки помещение проветривают - открывают двери, окна, вентиляционные люки и включают вентиляцию, после чего разрешается вход в помещение обслуживающего персонала.

Обработка помещений аэрозолями Йодинокolia не исключает использование средств специфической терапии, а также проведение лечебно-профилактических мероприятий при инфекционных болезнях птиц, предусмотренных соответствующими инструкциями.

11. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

12. Симптомов передозировки Йодинокolia не установлено.

13. При пропуске одной или нескольких обработок Йодинокolia применение его следует продолжить согласно инструкции.

14. Йодинокolia, как правило, не вызывает у животных побочного действия и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к йоду возможны покраснения кожи, зуд, которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств.

15. Несовместимость с другими лекарственными препаратами не установлена.

16. Продукты животноводства и птицеводства во время и после применения Йодинокolia используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Йодинокolia следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. К работе не допускают лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающим аллергическими заболеваниями, а также лиц моложе 18 лет, беременных и кормящих грудью женщин.

Во время работы запрещается пить, курить, принимать пищу. По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать.

18. Все виды работ проводятся с использованием средств индивидуальной защиты (хлопчатобумажный костюм или халат, перчатки, головной убор, защитные очки).

При появлении йодных пятен на коже, одежде их смывают 2-5% раствором тиосульфата натрия или каустической соды, или нашатырным спиртом и ополаскивают водой.

При попадании Йодинокolia на слизистые оболочки и в глаза необходимо их обильно промыть 2% раствором пищевой соды или 0,5-1% раствором тиосульфата натрия, а затем чистой кипяченой водой.

Любям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Йодинокolем. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Запрещается использование пустой тары из-под Йодинокolia для пищевых и бытовых целей.

20. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты», 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, 2.

Инструкция разработана ОАО завод «Ветеринарные препараты» 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.

С утверждением настоящей инструкции теряет силу инструкция по применению Йодинокolia, утвержденная Россельхознадзором 3 апреля 2006 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационное удостоверение выдано ОАО завод «Ветеринарные препараты»

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-7.12-0665 № ПРР - 3-1.5/01511